

平成21年5月15日

キョーリン リメディオ株式会社

Drug Information

平成21年5月度追補品販売のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度平成21年5月15日付官報にて、

- ・レボフロキサシン錠100mg「KRM」
- ・レバミピド錠100mg「KRM」
- ・ピカルタミド錠80mg「マイラン」
- ・トファルコン細粒20%

の4成分4品目の製品につきまして、
平成21年5月度追補収載品として薬価告示され、同日販売を開始いたしましたので、別紙製品概要の通りご案内させていただきます。

また、合わせまして統一名収載品である

- ・ファルジン錠400mg（統一名：シメチジン錠400mg）

の1成分1品目の製品につきまして
同日（5月15日）、販売開始いたしましたので、別紙製品概要の通りご案内申し上げます。

謹白



この件に関するお問い合わせは、弊社担当員若しくは下記までお願い致します。
キョーリン リメディオ株式会社 営業本部 営業管理部

Tel(076)239-2497 FAX(076)239-2998

< 製品概要 >

1. 製品名 和名:レボフロキサシン錠100mg「KRM」
 洋名:LEVOFLOXACIN Tablets 100mg“KRM”
2. 一般名 レボフロキサシン水和物
3. 効能・効果

< 適応菌種 >

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンス属、ペスト菌、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兔病菌、カンピロバクター属、ペプトストレプトコッカス属、アクネ菌、Q熱リケッチア(コクシエラ・ブルネティ)、トラコーマクラミジア(クラミジア・トラコモティス)

< 適応症 >

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、さ瘡(化膿性炎症を伴うもの)、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兔病、Q熱

4. 用法・用量

通常、成人に対して、レボフロキサシン水和物として1回100mgを1日2～3回経口投与する。

なお、感染症の種類および症状により適宜増減するが、重症または効果不十分と思われる症例にはレボフロキサシン水和物として1回200mgを1日3回経口投与する。

レジオネラ肺炎については、レボフロキサシン水和物として1回200mgを1日3回経口投与する。

腸チフス、パラチフスについては、レボフロキサシン水和物として1回100mgを1日4回、14日間経口投与する。

炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兔病、Q熱については、レボフロキサシン水和物として1回200mgを1日2～3回経口投与する。

5. 薬価基準収載医薬品コード 6241013F1083

6. 薬価 100mg1錠 121.60円

7. 包装 100mg:PTP包装 100錠、500錠
 バラ包装 500錠

8. JANコード

レボフロキサシン錠100mg「KRM」 PTP100錠:4987154200011
レボフロキサシン錠100mg「KRM」 PTP500錠:4987154200028
レボフロキサシン錠100mg「KRM」 バラ500錠:4987154200325

9. 薬価収載日 2009年5月15日

10. 発売日 2009年5月15日

<製品概要>

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 製品名 | 和名:レバミピド錠100mg「KRM」
洋名:REBAMIPIDE Tablets 100mg"KRM" |
| 2. 一般名 | レバミピド |
| 3. 効能・効果 | ・胃潰瘍
・下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善
急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期 |
| 4. 用法・用量 | ・胃潰瘍
通常、成人には1回1錠(レバミピドとして100mg)を1日3回、朝、夕及び就寝前に経口投与する。
・下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善
急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期
通常、成人には1回1錠(レバミピドとして100mg)を1日3回経口投与する。 |
| 5. 薬価基準収載医薬品コード | 2329021F1048 |
| 6. 薬価 | 100mg1錠 15.50円 |
| 7. 包装 | 100mg:PTP包装 100錠、500錠、1050錠
バラ包装 500錠 |
| 8. JANコード | レバミピド錠100mg「KRM」 PTP100錠:4987154195010
レバミピド錠100mg「KRM」 PTP500錠:4987154195027
レバミピド錠100mg「KRM」 PTP1050錠:4987154195034
レバミピド錠100mg「KRM」 バラ500錠:4987154195324 |
| 9. 薬価収載日 | 2009年5月15日 |
| 10. 発売日 | 2009年5月15日 |

<製品概要>

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. 製品名 | 和名:ビカルタミド錠80mg「マイラン」 | |
| | 洋名:Bicalutamide Tab.80mg“Mylan” | |
| 2. 一般名 | ビカルタミド | |
| 3. 効能・効果 | 前立腺癌 | |
| 4. 用法・用量 | 通常、成人にはビカルタミドとして80mgを1日1回、経口投与する。 | |
| 5. 薬価基準収載医薬品コード | 4291009F1179 | |
| 6. 薬価 | 80mg1錠 | 851.50円 |
| 7. 包装 | 80mg:PTP包装 | 30錠、100錠 |
| 8. JANコード | ビカルタミド錠80mg「マイラン」 | PTP30錠:4987154025195 |
| | ビカルタミド錠80mg「マイラン」 | PTP100錠:4987154025201 |
| 9. 薬価収載日 | 2009年5月15日 | |
| 10. 発売日 | 2009年5月15日 | |

< 製品概要 >

- | | |
|-----------|---|
| 1. 製品名 | 和名:トファルコン細粒20% |
| | 洋名:TOFALCONE Fine Granules 20% |
| 2. 一般名 | ソファルコン |
| 3. 効能・効果 | 下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善
急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期
胃潰瘍 |
| 4. 用法・用量 | 通常、成人にはソファルコンとして1回100mgを1日3回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。 |
| 5. 薬価基準収載 | 医薬品コード 2329011C2079 |
| 6. 薬価 | 1g 16.90円 |
| 7. 包装 | 分包0.5g:90包、1200包
バラ包装:1kg |
| 8. JANコード | |
| | トファルコン細粒20% 0.5g×90包:4987154367202 |
| | トファルコン細粒20% 0.5g×1200包:4987154367219 |
| | トファルコン細粒20% バラ1kg:4987154367332 |
| 9. 薬価収載日 | 2009年5月15日 |
| 10. 発売日 | 2009年5月15日 |

<製品概要>

1. 製品名 和名:ファルジン錠400mg
 洋名:PHARDINE Tablets 400mg
2. 一般名 シメチジン
3. 効能・効果 ・胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群、逆流性食道炎、上部消化管出血
 (消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)
 ・下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善
 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期
4. 用法・用量 ・胃潰瘍、十二指腸潰瘍
 通常、成人にはシメチジンとして1日800mgを2回(朝食後及び就寝前)に分割して経口投与する。
 また、1日量を4回(毎食後及び就寝前)に分割もしくは1回(就寝前)投与することもできる。
 なお、年齢・症状により適宜増減する。
 ・吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群、逆流性食道炎、上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)
 通常、成人にはシメチジンとして1日800mgを2回(朝食後及び就寝前)に分割して経口投与する。
 また、1日量を4回(毎食後及び就寝前)に分割して投与することもできる。
 なお、年齢・症状により適宜増減する。
 ただし、上部消化管出血の場合には、通常注射剤で治療を開始し、内服可能となった後には経口投与に切り換える。
 ・下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善
 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期
 通常、成人にはシメチジンとして1日400mgを2回(朝食後及び就寝前)に分割して経口投与する。
 また、1日量を1回(就寝前)投与することもできる。
 なお、年齢・症状により適宜増減する。
5. 薬価基準収載医薬品コード 2325001F2013
6. 薬価 400mg1錠 6.10円
7. 包装 400mg:PTP包装 100錠
8. JANコード
 ファルジン錠400mg PTP100錠:4987154192019
9. 薬価収載日 2009年5月15日
10. 発売日 2009年5月15日